



Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Biotehnički fakultet - Trg Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica

Tel: 020 206 713 Fax: 020 206 712

E-mail: extension-pg@t-com.me

Radovi u pčelinjaku tokom jula

U ovom mjesecu pčelari posebnu pažnju poklanjaju ocjenjivanju vrijednosti matice. Njen kvalitet se određuje po količini i izgledu legla. Po ponašanju pčela može se utvrditi postojanje matice. Ukoliko je društvo bez matice pčele slabije izljeću, nemaju straže na letu i mile po prednjoj strani košnice. Kada se košnica otvorí vidi se neuobičajeno lepezanje krilima. Ukoliko se utvrdi da nema dovoljno legla onda se pristupa zamjeni matice. I tokom ovog mjeseca, iako rijetko, može doći do prirodnog rojenja, pa se preduzimaju sve aktivnosti da do njega ne dođe. Livadske trave mogu dobro zamediti pa se pčelama obezbjeđuje dovoljno prostora za unos nektara i cvjetnog praha. Tako se pčele podstiču na bolje njegovanje legla i početak priprema za zazimljavanje. Uz pomoć mladih matice, novododanih satnih osnova i okvira građevnjaka, pčele se stimulišu da što bolje njeguju leglo, proizvode vosak i prikupljaju nektar i cvjetni prah. Novoizgrađeno saće postavlja se usred legla da bi matica u njega što prije položila jaja. Novoformirani rojevi i u ovom mjesecu su stalna briga pčelara. Viškovi meda se oduzimaju krajem mjeseca, nakon čega se može pristupiti uništavanju varoe. Počev od jula zavisno od uslova paše, varoa se uništava mravljom kiselinom. Najpovoljnije bi bilo da se tretman završi prije pojave legla pčela koje će ući u zimu. Koncentracija kiseline je 60 odsto, a temperatura vazduha za vrijeme tretmana od 15 – 25 stepeni. Kiselina se sipa u isparivače ili neki upijajući materijal i dodaje društвима. Kombinacijom ram građevnjaka i mravlje kiseline uništiće se preko 90 % varoe, što je i najefikasnije sredstvo u borbi protiv ovog krpelja.

Većina matice se zamjeni tokom jula i avgusta. Mlada oplođena matica koja valjano polaže jaja, stavlja se na ram s kojeg je prethodno uklonjena stara matica. Pčele takvu maticu odmah prihvataju. Ovakva društva ulaze u zimu s dosta mladih pčela, koje krajem zime i u rano proljeće uspješno njeguju leglo. To je od velikog značaja za brz prolječni razvoj pčelinjih društava. U ovom periodu obavezna je zaštita pčelinjih zajednica od velikih vrućina. Ovo je mjesec pripreme društava za obezbjeđivanje zimnice. Paša u julu je sljedeća: djetelina, lipa, suncokret, bosiljak, pitomi kesten, metvica, soja, amorfa, dupčac, drača, vries. Jul je posljednji mjesec prave pčelarske sezone. Nova sezona počinje već narednog mjeseca. Krajem jula vrši se pregled društava, svi nedostaci se otklanjaju i time se stvaraju uslovi za normalan razvoj društva i dobra priprema za zimu. Ukoliko se pronađu stari ramovi, izvitopereni ili sa većim brojem trutovskih ćelija, uklanjanju se i dodaju novi.



Mr Nebojša Veličković