



Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Biotehnički institut - Trg Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica
Tel: 081 206 713 Fax: 081 206 712 Mail: extension-pg@cg.yu

Savjet maslinarima

Savjetujemo maslinare da poslije rezidbe zaštite maslinu protiv gljivične bolesti **paunovog oka čiji** je prouzročivač gljivica (*Spilocea oleaginea*) i bakterijske bolesti **raka masline** (izaziva je bakterija *Pseudomonas syringae* pv. *savastanoi*).



Paunovo oko

Bolest paunovo se manifestuje na listu masline na kojem se razvijaju okruglaste pjege koje liče na šare na paunovom perju uslijed čega je bolest i dobila ovaj karakterističan naziv. Pjege su u početku bjeličaste vremenom dobijaju prsten i intezivniju žutu boju, spajaju se... dolazi do opadanja lišća uglavnom s donjeg dijela krošnje. Masline je neophodno tretirati protiv ove bolesti pogotovo u uslovima promjenljivog i kišovito vremena.

Poslije rezidbe, stabla maslina su mehanički oštećena pa se tako stvaraju uslovi i za zarazu bakterijom (*Pseudomonas syringae* pv. *savastanoi*) koja je prouzročivač bolesti raka masline. Tretiranjem maslina poslije berbe vrši se dezinfekcija nastalih oštećenja i stvaraju se nepovoljni uslovi za zarazu pomenutom bakterijom.

Protiv gore navedenih bolesti upotrijebiti preparate na bazi bakra (**Bor-dovska čorba, Kuprablau, Nordox 75 WG, i dr preparate na bazi bakra**).



Crveno ulje (kombinacija bakra i mineralnog ulja) koristiti ako postoji napad maslinine grbave štitaste vaši (*Saissetia oleae*)

Prilikom tretiranja koristiti preporučene koncentracije i biljke dobro okupati rastvorom sredstva.



Rak masline

Kontić Slavica, dipl. ing
Stučni saradnik za zaštitu bilja