



Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Biotehnički fakultet - Trg Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica

Tel: 020 206 713 Fax: 020 206 712

E-mail: extension-pg@t-com.me

27.05.2013.

Savjet za zaštitu vinove loze

Vinogradari!

Obratite pažnju na redovnu i pojačanu zaštitu svojih zasada ovih dana, s obzirom na nestabilne vremenske prilike i gotovo svakodnevnu kišu, koja se smenjuje sa sunčanim periodima. Ovo je kritičan period za pojavu plamenjače, uzimajući u obzir da je vinova loza u fazi intenzivnog porasta lastara i cvjetanja.

S obzirom da je od posljednje objave prošlo više od 10 dana, potrebno je odraditi hemijski tretman. Preporučuje se primjena sistemskih fungicida kao što su: Mikal, Ridomil, Cabrio Top, Quadris (sredstva navedena u prethodnoj objavi).

Ukoliko u zasadu primijetite simptome bolesti (uljane pjege na licu lista i bijela navlaka na naličju lišća i na cvastima) odmah obavite hemijski tretman fungicidima i skratite intervale između hemijskih tretmana na 5-7 dana.

Mr Dragana Radunović, dipl.ing.



Sl.1. Cvjetanje



Sl.2. Simptomi plamenjače na bobicama