



Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Biotehnički institut - Trg Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica
Tel: 081 206 713 Fax: 081 206 712 Mail: extension-pg@cg.yu

Zaštita masline od muve masline

Redovnim pregledom maslinjaka duž crnogorskog primorja utvrđeno je iznenadno povećanje broja muva u klopama za kontrolu leta muve. Registrovani su i prvi aktivni ubodi muve masline u plod masline. Ovakvo stanje zahtijeva hitno sprovođenje mjera zaštite.

Tretiranje maslina moraju obaviti sami maslinari prskanjem maslina sa zemlje. Ukoliko maslinari nijesu nabavili Buminal preporučuje se upotreba preparata Lebaycid i to prskanjem cijelih stabala. Koristi se 12ml preparata Lebaycid po stablu za stabla sa velikom krošnjom bez obzira na količinu vode koja će se potrošiti za prskanje jednog stabla.

Ukoliko je neko od maslinara nabavio Buminal a zasad mu je izolovan može tretirati Lebaycidom i Buminalom tako što na 12ml Lebaycida doda 100 ml Buminala i dopuni prskalicom vodom do 10 l i tim rastvorom prska samo pojedine južne djelove krošnje.

Kako bi se rod masline zaštitio od napada tj zaštita masline bila uspješno sprovedena svi maslinari moraju da daju maksimalan dopinos i da prksanje izvedu u najkraćem mogućem roku. Mole se predsjednici udruženja masli-

nara da svoje članove informišu o neophodnosti prskanja maslina (odmah).



Svako kašnjenje i nepridržavanje preporuka Centra za zaštitu bilja i Savjetodavne službe ide na štetu maslinara i njihova je odgovornost!

Kontić Slavica, dipl. ing. polj.

Stručni saradnik za zaštitu bilja